

幼
幼
新
書

幼幼新書卷第十四 熱風暑寒 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

常熟嚴 澍道時校

溫壯第一

巢氏兒藏府不調內有伏熱或挾宿寒皆搏胃氣足
陽明胃經主肌肉胃不和則氣壅滯故蘊積體熱為
溫壯兒糞黃臭腹有伏熱宜龍膽湯一切癩門若糞白酢
臭挾宿寒不消脹熱雙丸積聚門輕者少服默除甚者
小增令微利皆當節哺令胃氣調和若不節傷胃病

易復腹滿再三利尚可多則傷兒

肘後

大黃

分四

甘草

炙

當歸

芍藥

各二分

水一升六合煮八合分三服兒胎寒腹痛乳哺不時溫壯熱吐利不常諸驚掣縮二十五癰瘡發口瘡惡核目赤黃瘦變蒸用芍藥赤白各半如宣泄純赤生用二分疫癘溫壯肺邪寒熱用四分利小便用赤驚狂瘡疥目赤瀉血當歸肉多枝少氣昏者生二分欲血脈流暢不為瘡核及止腹痛胎寒

腹痛喘不已用四分如理寒熱破積解溫壯加大黃如牛舌緊硬用蜀中者欲宣蕩用河西錦紋生者四分下利二分甘草赤黃斷理緊而易折者炙二分虛熱邪氣大能安神定驚和而不寒故號國老冒寒邪加去節麻黃一分驚風反折戴眼掣縮加細辛四分中風加獨活二分

千金竹葉湯主溫壯腹滿息不利或微腫亦主極羸不食堅痞手足逆冷

一有柴胡

竹葉

一升

小麥

半升

甘草

炙

黃芩

苦蕒根

澤瀉

茯苓

知母

白朮

大黃

桂心

薑

人參

麥門冬

半夏

當歸

咬咀水七升煮麥竹葉四升去滓內藥煎一升六

合分四服

聖惠黃芩散治溫壯或下後熱不除舌大不舍乳胃

有痰口生瘡兼驚悸犀角散無硝蛇多施子犀角治心神不安

黃芩

川大黃

釣藤

甘草

川芒硝

各半兩蛇蛻三寸

粗散一錢水一盞煎五分去滓入牛黃少許量溫服

牛黃散治溫壯體常熱

牛黃

甘草

炙各半

梔子仁

子芩

柴胡

龍膽

各一分

細羅金銀湯調下不時服半錢量兒

胡黃連散治溫壯常飲水

胡黃連

犀角

牛黃

龍膽

川大黃

微炒

甘草

炙

知母

各一分

麥門冬

焙半

兩

細羅沙糖水調半錢量加減

牛黃丸治溫壯及驚熱

牛黃

天竺黃

腦麝

熊膽

各一分

犀角

胡黃連

郁李仁

山梔

各半兩

研勻糯米粥丸如麻子不時薄荷湯下三丸量加
嬰孺雀糞丸治病後腹中不調飲食不節腹滿溫壯
并客忤兼傷冷乳

雀糞

牛黃

各一分

芩

芍藥

乾薑

甘草

炙各二分

麝

小麥麵

大黃

當歸

人參

各三分

末蜜丸麻子大一服三九日三欲下五丸常將三

丸乳前後哺可加黃耆黃芩各二分炒

五味湯治下後身溫壯胃有結熱

五味子

三分

黃芩

柴胡

芒硝

麥門冬

石膏

各二分

黃連

甘草

當歸

各一分

大黃

四分

水二升七合煮一升三合去滓內芒硝再沸二百

日兒服三合日三夜一有痰必吐

壯熱第二

巢氏兒血氣盛五歲熱薰于外其發無漸名壯熱若
不甚盛為溫熱溫壯相似伏熱者大便黃臭挾宿寒
者糞白酸臭此藏府不調冷熱之氣俱乘腸胃蘊積
漸染而發壯熱不歇變驚極重者成癇

錢乙論潮熱依時發熱過時即退欲發驚壯熱一向
不已甚發驚癇風熱者身熱而口氣熱有風證溫壯
但溫不熱

壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似若未辨服升
麻葛根湯惺惺散傷寒門小柴胡湯傷寒頭門惟傷食大
便酸臭不化畏食或吐食宜下

莊氏壯熱有七

傷寒壯熱時時舌出繳唇

斑瘡壯熱咳嗽嘔聲唯耳聾不熱不然噦逆也

風壯熱聾兩邊胞一作運動吸吸然甚者聾生瘡手有

血紋

氣積壯熱早辰手足冷曉沉重困悶晚晡潮熱

虛積壯熱脚冷手不冷積在左肋右腮赤在右左腮赤

驚壯熱愛睡便仰卧妄語驚跳啼叫搖頭弄舌上竄
喉痺壯熱時時嗽思飲冷水喉痛時復小寒

千金治腹大短氣熱有進退喫食不安穀不化

大黃

黃芩

甘草

芒硝

麥門冬

各半兩

石膏

一兩

桂心

八銖

呖咀水三升煮一升半分三服暮歲兒作五服

五物甘草生摩膏治新生肌膚嫩弱風邪所中或中

大風手足驚掣

甘草

防風

各一兩

白朮

桔梗

各廿銖

雷丸

二兩半

咬咀不中水豬肪一斤煎膏內藥微火煎稠去滓
彈丸大一枚炙手塗摩百過無病兒早起摩顙及
手足心甚辟寒風

外臺白芷湯浴兒根苗亦得苦參亦佳

秦白皮一升煎湯澄清浴差冷洗赤眼亦效

日華子治壯熱一切瘡疥皮膚癢痒

梓白皮湯洗秋梓佳

聖惠犀角散治壯熱口乾心煩不欲食

犀角

黃耆

各一分

黃芩

麥門冬

焙

柴胡

川升麻

甘草

炙各半兩

粗散一錢水一盞淡竹葉七片煎五分去滓量溫

服

人參散治壯熱心神不安

釣藤

人參

川升麻

赤茯苓

各半

兩

犀角

山梔子

甘草

炙各一分

粗散一錢水一小盞煎五分去滓溫服

大黃散治晷歲至三歲壯熱

川大黃

兩一

石膏

兩半

柴胡

枳殼

麩炒

黃芩

赤芍藥

梔子

知母

川升麻

杏仁

麩炒各三分

粗散一錢水一小盞清竹葉七片煎五分去滓溫

服

牛黃散治卒壯熱心煩壅

牛黃

甘草

各半分

黃芩

梔子

龍齒

犀角

寒水石

各一

麝香

細散竹瀝調半錢服量加減

譚氏

天南星

半夏

滑石

各二錢

巴豆霜

字一

細末麩糊丸如粟一歲三粒葱湯下

嬰孺竹瀝葛根湯治壯熱發疹尚熱

竹瀝

升二合

生葛

升五合

牛黃

三黑豆許入汁內

月內兒服半合四五歲作四服

萬金鈞藤散治壯熱驚悸大小便赤澀

釣藤

天竺黃

地骨皮

各一分

茯神

犀角

龍膽

川芎

甘草

赤茯苓

各半兩

川大黃

炒三分

末一錢水一盞煎五分去滓溫服

趙氏人參保童丸治稟氣弱筋骨軟肌肉淺薄乳食不成肌肉面黃體熱多汗

人參

石蓮肉

史君子

沒石子

乾山藥

當歸

白芍藥

白朮

各半兩

木香

一分

黃連

一分半夏末一分同炒黑去半夏

末稀糊丸如麻子服七丸三歲以上十九溫湯下
吉氏人參散治傷寒潮熱鼻塞頭疼亦治清涕壯熱

人參

茯苓

羌活

當歸

前胡

甘草

各一錢

麻黃

去節三錢

末半錢水半盞薑一片煎三分溫服

時氣第三

巢氏四時忽有非節之氣如春應暖而寒夏應熱而
冷秋應涼而熱冬應寒而溫其氣傷人病頭痛壯熱
與傷寒相似無同長幼病証略同此時通行此氣名

時氣世呼天行病

天行病發黃脾與胃合俱象土色黃候于肌肉熱入脾胃其氣蘊積蒸發于外故黃

時氣腹滿熱入腹与藏氣相搏氣痞塞故腹滿毒氣乘心煩懊者死

失時投藥不與病會致病連滯乍差乍劇或寒或熱

敗壞無常

寶鑑名敗氣

日數未滿本當壯熱而邪不退其乘于陽爭則熱乘于陰爭則寒陰陽之氣為邪所并互相乘加故寒熱

成瘡

時氣吐下後壯熱不歇是腸胃宿虛而又吐利則重虛其熱乘虛入裏表裡俱熱停滯不歇故雖吐下猶熱

時氣熱渴後不嗜食而面色青是胃中餘熱未盡氣滿故不嗜食諸陽俱上榮于面陽虛未復本帶風邪挾冷搏于氣血故面青

時氣熱退氣血未和藏府熱勢未盡或起早勞動或飲食不節病復多重于初血氣已虛重傷故也

寶鑑時氣歌

時氣皆因節令虧
頭疼壯熱汗微微
良醫若得看形候
須作傷寒病有歸

時氣后大小便不通歌

熱毒還從府氣衝
便成結熱在腸中
身體苦煩多躁渴
更兼便溺不能通

時氣躁渴歌

誰言吐下熱無餘
只為元因藏府虛
熱盛更虛皮肉澁
至令煩渴躁難除

石壁經歌

夜熱天明又復涼都緣藏府有風傷只消將藥

醫脾藏脾一除熱次使神方瀉大腸患候但觀喉厭

動更看眼急赤一臍頭光此病已傳瘟疫候若能

辯別是醫王

此內傷物外傷邪所致先散邪次去積主夜頭額

多汗口中涎響脾風故多言非祟也風髓宜七寶散溫壯門

形證論緣飢過食冷滯脾胃氣不行諸經夜熱晝涼

先南星丸傷寒變三五服後間檳榔散煩熱則氣和

又須白丁香膏見未取或只磨積調氣不得便取恐難止為肚大成疳疾

聖惠解肌湯治時氣壯熱頭疼咳嗽不食

麻黃

去節三

杏仁炒

赤芍藥

貝母炮

柴胡

葛根

甘草

炙各半兩

石膏

一兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓不時量服

麥門冬散治時氣咳嗽壯熱

麥門冬

焙

川升麻

各一兩

貝母

煨

甘草

炙各三

赤芍藥

杏仁

麩炒各半兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓入淡竹瀝半合更煎一兩沸不時量兒溫服

葛根散治時氣頭痛體熱煩躁

葛根

麥門冬

各三分

黃芩

赤芍藥

人參

犀角

川升麻

甘草

炙各半兩

石膏

一兩

散一錢水一小盞煎五分去滓不時溫服量兒

生地黄散治時氣壯熱咳嗽心胃脹悶乳食不下

生地黄

麥門冬

焙各一兩

款冬花

杏仁

炒

陳皮

去白焙各三分

甘草

炙半兩

粗散一錢水一盞煎五分入竹茹半合煎去滓不

時溫服量兒

葛根散治時氣煩渴腹中痞實

葛根

黃芩

柴胡

各半兩

甘草

炙一分

川大黃

炒一兩

粗羅散一錢水一盞煎五分去滓不時溫服利為

度

蘆根散治時氣嘔吐不止

生蘆根

人參各一兩

竹茹半兩

細剉服半分水一盞煎五分去滓不時量兒溫服

嬰孺治壯熱時氣驚悸并熱瘡

釣藤炙

人參

蚱蟬炙

子芩各一分

蛇殼三寸炙

龍薤四分

防風

澤蘭各二分

石蜜一兩湯成入竹歷一升

切水三升煮七合量兒細服

錢乙人參生犀散解時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿心忪

驚悸藏府或秘或瀉調胃進食又一切風熱服涼藥

即瀉而減食者

人參

錢三

前胡

錢七

甘草

錢二

桔梗

杏仁

錢五

羅過每二錢水一盞煎八分去滓食後溫服

張渙方

人參

生地黃

各一兩

犀角

黃芩

柴胡

各半兩

甘草

一分

粗末服一錢水一錢薑二片煎五分去滓溫服

傷寒證八物麥門冬飲治天行壯熱咳嗽心腹脹滿

麥門冬

三兩

甘草

炙

人參

各一兩

紫苑

升麻

各二兩

貝母

一分

服三錢水一盞茅根半握煎七分去滓八竹瀝少

許再煎服

吳藍飲療天行頭痛壯熱

吳藍

大青

各二兩半

麥門冬

甘草

炙各三錢

茵陳

一分半

梔子

仁十五枚

服三錢水一盞八蘆根半握薑五片煎七分去滓

活人書水解散治天行頭痛壯熱一二日兼治疱疹

未出煩躁或出身高熱

麻黃

去節
四兩

大麻

黃芩

桂心

甘草

炙

芍藥

各二
兩

粗末生熟湯浴訖暖水調二錢相次二服得汗利

便差強實人服二方寸匕三伏中宜用春去大黃

朱氏人參散解利傷寒四時氣痙上焦虛熱心神恍

惚脾胃不和飲食無味口苦舌乾煩悶

人參

茯苓

羌活

獨活

桔梗

知母

麻黃

去根
節

枳殼

麩炒

甘草 炙

川芎

陳皮 去白

白朮

厚朴 薑製

柴胡 水煎

桂心 不見火

前胡

削木

甘草節

等分末二錢水一盞薑棗煎七分要汗葱白豆豉
薑煎服嗽加杏仁麻黃兒入薄荷婦人止入薑嵐
瘡柳桃條二七節

溫病第四

巢氏冬時嚴寒人觸胃之寒入肌肉春得暖而發頭
痛吐熱謂溫病又冬應寒而反暖其氣傷人即發亦

頭痛壯熱謂冬溫病凡邪之傷人皆觸胃而感之兒
雖不然乳母抱持解脫不避風邪寒熱之氣亦成病
巢氏溫病下利者腸胃宿虛熱入腸胃與水穀相搏
故

鼻衄者熱乘氣入血肺應皮毛主氣開竅于鼻溫病
則邪客皮膚而搏氣結聚成熱熱乘于血血得熱從鼻
出為衄凡發汗不出或從來無汗鼻燥喘鼻息有聲
此又衄兒衄至一升數合熱因得歇至一斗數升兒
死

溫熱病四五日後熱入裏內熱腹滿宜下若下早裡虛氣逆熱結胃上則滿短氣為結胃

仲景冬傷于寒春必溫病

醫局柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼
鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠黏

柴胡

石膏

前胡

乾葛

赤芍藥

各五兩

黃芩

桑皮

荆芥穗

各

七兩

升麻

廿五兩

粗末二錢水一盞薑三片豉十餘粒煎七分去滓

稍熱兒三服

人參羌活散治溫邪寒邪溫病時疫瘡疹頭痛體疼
壯熱多睡及潮熱煩渴痰實咳嗽

人參

羌活

獨活

柴胡

芎藭

枳殼炒

白茯苓

甘草

炙各一兩

前胡

桔梗

地骨皮

天麻

炙各半兩

散一錢水七分入薄苛少許煎五分去滓溫服不
時

莊氏甘桂湯春間疫氣欲作先氣壅畏風痰嗽頭昏

小兒科書 卷之十四 十一
臍塞困悶無問大小以此驅之

甘草

炙

官桂

去皮

五味子

黃芩

各半兩

柴胡

兩四

咬咀三錢水一盞薑五片煎七分去滓溫服

熱病第五

仲景論冬傷于寒夏為熱病

黃帝曰老人嬰兒熱病腹滿者死

聖惠冬冒寒氣入肌肉不即發夏為熱病

千金升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹

堅急大小便不利或口瘡或四肢攣掣驚成癇時發時醒醒後身熱

升麻

白薇

麻黃

去根節

萎萎

柴胡

甘草

炙各半兩

黃芩

一兩

朴硝

大黃

釣藤

各六銖

以咀水三升煮麻黃去沫內諸藥煮一升兒一兩

日服二合量加

聖惠解肌散熱病頭痛口乾壯熱心神煩躁

麻黃

三分

葛根

赤芍藥

黃芩

升麻

甘草

炙赤各半兩

篩散一錢水一盞葱白五寸煎五分去滓不時溫服量汗差

石膏散治熱病煩熱驚悸

石膏

川大黃

炒

甘草

炙各半兩

大青

黃芩

梔子仁

知母

萎萎

川升麻

葛根

龍膽

各一分

散一錢水一盞煎五分去滓不時量兒溫服

吳藍散治熱病頭痛心躁眼黃

吳藍

大青

蘆根

石膏

各一分

甘草

炙赤

麥門冬

去心焙

黃芩

各三分

茵陳

梔子仁

各半兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓不時量服

犀角散治熱病煩熱大小腸秘澀心胃悶亂

犀角

赤芍藥

黃芩

川升麻

梔子仁

地骨皮

甘草

炙各半兩

麥門冬

川大黃

炒各三分

篩散一錢水一盞煎五分去滓不時溫服量兒

牛黃散治熱病壯熱心煩

胡黃連

梔子仁

牛黃

甘草炙各半兩

子芩

兩一

細羅散不時蜜水調半錢量服

張煥石膏散

石膏

白茯苓

葛根

各一兩

甘草炙

黃芩

芍藥

各半兩

細末一錢水一盞竹葉薄荷少許煎五分去滓溫

服

真珠散治熱病口乾心神煩悶

真珠

牛黃

龍腦

錢各一

瓜根

茯神

朱硃

飛各半兩

馬牙硝

寒水石

各一

分

細末半錢蜜水調服

傷風第六

錢乙論傷風昏睡口氣熱呵欠頓悶大青膏

驚熱

發

散不解有下證大黃丸

見未

飲水而善食者微下餘勿

下

傷風自利

一有手足冷

脾藏虛怯當補益黃散發散大青

膏未差調中丸有下證大黃丸下後服溫驚丸

俱胃氣不

和門

傷風腹脹脾藏虛當補喘發散仍補脾去脹塌氣丸

胃氣不和門

傷風兼心驚悸兼肺悶亂喘息硬氣長出氣嗽兼腎

畏明各隨補毋藏虛見故也

傷風下後餘熱下太過胃中虛熱飲水無力當生胃

中津液多服白朮散

胃氣不和門

傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣粗大便黃白嘔吐
乳食不消時咳嗽兼見五藏証煎入藏君臣藥化大
青膏後服益黃散如曾下或無下證勿下此肺受寒
不能入脾

傷風吐瀉身熱多睡能乳飲水不止吐痰大便黃水
此胃虛熱渴吐瀉當生津液

散白朮

後用黃散

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白悶亂不渴噤氣長出氣
晦露睛傷風在甚輕怯因成吐瀉當補脾後發散二
証多在春冬

王訣歌

鼻塞傷風肺受寒喘欬驚啼卧不安頰赤口乾
頻發熱吐瀉邪攻藏府傳

先解熱後下涎次平胃

劉氏麥湯散治傷風傷寒壯熱咳嗽痰盛

麻黃

去根節薑汁浸一宿

知母

石膏

煨

葶藶

隔紙炒

地骨皮

杏仁

滑石

等分為末半錢小麥湯調服

莊氏方

京豉葱生研作餅貼顙上有邪氣者豉桃頭生研貼

吉氏金箔丸治驚風妳食不化成外傷風壯熱氣粗慢風掣頭口眼不閉及赤白痢

金箔卅九片

朱硃

水銀

膩粉

牛黃

青黛

蟬殼

姜蚕

麻黃去節

白附子

蝎

天麻酒浸炙

犀角

天南星炮各麝隨多二錢

末煉蜜丸如梧子服二九薄苛湯化下

傷暑第七

醫局香薷丸治傷暑伏熱躁渴脅悶頭目昏眩胃膈
煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食霍亂
吐利轉筋

香薷

紫蘇莖葉

去粗皮

木瓜

各一兩

丁香

白茯苓

藿香葉

甘草

炙

檀香

各半兩

細末蜜丸每兩作三十九服一二九細嚼溫湯下
新汲水化亦得兒不時服半丸

張渙清膈飲治伏暑嘔吐

香茹

淡竹葉

焙各一兩

白茯苓

人參

半夏

湯洗七次焙

檀香

甘草

炙各半兩

白粳米

合一

粗末一錢水一大盞煎七分去滓溫如熱水時時

服

傷寒第八

巢氏云冒寒于冬入腠理搏血氣則發寒熱頭痛體疼為傷寒又春應煖而反寒傷即發病為時行傷寒兒多由解脫時久寒氣傷之診其脉一投而止得病

一日假令六投六止者得病六日脈洪易治細微難治

傷寒瀕解肌令腠理開津液為汗發泄其氣則熱歇無問長幼男女春夏宜汗脈浮大宜汗病在表故千金論時行疾疫之年兒出腹便患瘕治其時行節度如大人用藥分劑少異藥少冷

聖惠傷寒勿用燥藥發汗燥極于藏府熱極傷心氣多厥不可治用寒藥陽受于冷冷熱相擊驚叫不睡熱衝腦頭縫開皮肉筋脉急脹不可治用熱藥助陽

也陽極則陰爭四肢汗出如油手足或熱或冷多在
顛驚瘕不可治

茅先生傷寒變蒸夾驚夾食中風所中傷寒各別根
源用藥如傳變吐不止大小便不通大渴耳濃出身
生赤癰心狂眼視鼻口乾燥不治

漁東王先生兒傷寒可醫者七

鼻內清水是傷寒鼻肺竅身皮毛髮皆主肺涕流清
水身寒毛立後身熱躁呌口乾冷汗寒邪傷正氣正
氣軟弱不能主身被邪攻出故汗多令面黃無力若

不止則體生風宜補實

皐塞是傷寒所受正在肺外邪傷肺之正氣榮衛滯而不通故皐塞汗後更與通關藥

面赤是傷寒寒邪傷氣及邪入腹肺當旺不可受邪肺受患初傳心則虛而面赤口乾夜不卧陰陽相剋故日中可服解涼藥

吐白水是傷寒胃為寒邪所傷則弱而吐白水若吐食則入脾差後身發黃脾胃俱象土故黃宜早暖脾胃

兩眼黃赤是傷寒脾先受色黃次傳肝主眼共脾邪入肝令眼黃宜洗肝後發汗

小便黃赤是傷寒寒氣傷肺肺虛不受于心心以小腸為府心實傳府受邪則滯榮氣而赤後尿如血通小便後取

不可醫者七

傷寒面黑不治寒氣傷皮膚即入肺肺傳腎腎主水水屬北方色黑溲傳心心屬火水大能剋火故面黑不治

傷寒大小腸痛不治寒傷肺肺以大腸為府藏不能
受倒傳入一藏載傳入心則火剋金心將小腸為府
故大小腸痛

傷寒忽作鴟聲不治肺主聲寒邪傷肺則絕故聲出
不迴

傷寒叫聲不出不治傷寒入腎失解腎絕不能作聲
死

傷寒糞黑不治大腸肺之府寒邪傷肺肺絕不能行
血血色黑從大腸下如灰戴鴨血者死如無赤黑不

妨是熱盛宜涼藥

傷寒爪甲黑不治肝主筋爪甲筋之餘傳肝邪勝正氣肝絕不能榮爪色黑死

右皆邪氣傷藏府滯其血氣則寒熱血脈亂不能飲食頭痛面赤為陽毒面青不語多哭身寒為陰毒凡傷寒三日前宜汗三日後宜轉又言陰毒宜廻陽先

藥后陽毒宜解先涼藥后汗有初便宜轉汗有三兩日后宜汗勿拘

活人書序尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之咽喉不利痰嗽鼠粘子湯瘡疹頭額身溫熱大便

黃赤腹中有熱四順散

溫壯

連翹飲三黃丸頭額身

體溫熱大便白酸臭胃有食積雙丸主之兒無異疾

唯飲食不節心腹脹滿身熱頭痛雙丸悉治身軀潮

熱頭目碎痛心神煩躁小便赤大便秘此熱剽宜洗

心散

傷寒大小便不通

調胃承氣湯主之

傷寒自汗

頭疼發熱

而喂人惡寒傷寒証主升麻湯

傷寒口痛

無汗麻黃黃

芩湯有汗升麻黃芩湯皆要藥尋常不可過當服涼

藥胃冷虫動証與驚類須進驚藥加腦麝遂吐胃虛

成慢驚兒有熱証方可踈轉慎用丸藥當以大黃川

等以咀作湯以瀉滯蘊熱用巴豆乃攻食積之丸耳

楊大鄴兒傷寒瘟疫者神氣雖圓性情未定衣裳不
裨厚薄或恣情脫著嬌縱不常生冷任意因致頭疼
氣逆發熱增寒或飲多尚渴或虛汗連連精神吸啞
又綿繇用藥須精審根源細察表裡仍看脉體未可
便下切知虛實消息藥分在意處方

兒傷寒分數類一兼驚者因患驚風三日後治驚退
四五月忽嗽息粗面色恍惚變動渴不止急治脾宜

下麥湯散

見未

平胃丸

噦逆

附子散

虛寒

不得下冷藥

恐冰脾氣伏熱不退二挾實者因兒肥實吃食傷飽

閉却胃氣其候嘔逆唇紅面赤如曾吐嘔必頭痛或

瀉用鮓湯丸

急慢驚門

通利後

胃氣散

和胃氣不

麥湯散夾

服驚氣者氣臃脹咳嗽涎嚮煩躁藏府疼痛夢中虛

驚先用烏犀膏

風熱

滾涎次麥湯散及大驚丸

一切驚門

夾服至兩日下鮓湯丸通利一二日氣行後常服醒

脾平胃藥如遍身生黑黯血所謂爛斑不治三溫壯

者渾身微熱面紅常睡微汗因客風吹着毛竅冷氣

急鼻塞大段與變蒸相似只麥湯散與紅綿散瘡疹已出

未出門治之

小方論傷寒因三陰三陽受病與諸熱疾皆同惟傷寒眉聚呻吟宜麥煎散

茅先生初受傷寒候歌

小兒傷寒身壯熱面赤唇紅眼赤黃身上寒毛
初凜凜更兼冷汗潤汪汪鼻中清涕涓涓滴小
便如糝又如屎上喘鼻塞將加嗽口乾嘔逆是
尋常

死候歌

傷寒吐不止便逆是難通汗后發熱渴耳中瘡
潰膿身上斑黑點臍丘出傾筒咳嗽四肢厥心
狂下疔攻臙軟瞤不寤腹脹喘聲雄手足心熱
痛此候命須終

玉訣歌

臍中清涕肺傷風寒氣相傳臍不通壯熱脉浮
生內熱發驚涎盛轉加濃

先治風次下涎次調胃氣

石壁經正受傷寒候歌

傷寒初得渾身熱惡哭多啼無喜悅眼紅臉赤
額驚風却被醫人道驚熱但須涼膈莫令渴渴
便飲水無休歇若將三黃飲子服汗出身輕便
不熱

風邪傷肌汗閉熱氣內蘊致煩躁多渴喘發熱
若服冷藥使汗不出反作別候須先出汗次涼膈
愈不然慢脾慢驚緣此得之

千金方藥四物解肌湯

芍藥

黃芩

升麻

葛根

各半兩

以咀水三升煮九合去滓周歲兒分三服

瘡疹傷寒瘟疫

疑似問服

治夏月傷寒四肢煩疼發熱嘔逆滿劇如祟寒熱相搏七物黃連湯

黃連

茯苓

黃芩

各十八銖

芍藥

葛根

各一兩

甘草

炙一兩六銖

小麥

三合

以咀水七升煮三升分三服服後胃中熱及咽喉痛皆差明日更進一劑此無毒但除熱下氣安

病人

水鑑治兒百日內壯熱

錘鐵

一斤燒赤水二斗淬三七遍魚
二停更入柳葉七片浴兒不用

油胡麻

粒三七

松柏葉

枝二七

牙硝

乳香

各一

金箔

片一

白芥子

粒三七

散蜜丸彈子大青物裹一丸如燒香法裹兒雙足

微汗差

兒三歲內傷寒陰陽二毒因母毒氣所致庸醫見壯
熱不食多睡便與冷藥物兒轉加甚蓋染熱動風藥

寒嘔逆宜走馬散

大黃

一兩水醋煮

乾地龍

一粒

牙硝

一分

末研三百下陰乾再研薑汁調灌驗量之

聖惠治傷寒壯熱頭痛射干散

射干

甘草

炙

川升麻

杏仁

炒

赤芍藥

石膏

各半兩

麻黃

去根節三分

桂心

一分

羅散服一錢水一小盞煎五分去滓不時加減溫

服

犀角散治傷寒頭痛壯熱

犀角

黃芩

川大黃炒

赤芍藥

麻黃

去根節

苦蕒根

各一分

柴胡

石膏

各半兩

粗末水一盞煎五分去滓量兒溫服

聖惠治傷寒心胃壅悶煩熱頭痛前胡散

前胡

兩半

石膏

兩一

黃芩

赤茯苓

枳殼

炒麩

甘草

炙各一分

羅散每一錢水一小盞煎五分去滓不時量兒溫

服

附子散治中風傷寒眼合手足厥冷口出涎啼聲不

出齒噤或時躁悶

附子炮

葛根各半兩

蜣螂淨炒

人參

桂心各一分

羅末服一錢水一盞薑少許煎四分去滓分二溫

服量增減

桔梗散治傷寒頭熱足冷顙門張多躁啼不睡小便

赤四肢熱

桔梗

人參

葛根各半兩

附子炮

甘草各一分

羅散每二錢水一盞薑少許煎五分去滓不時溫服量加減

知母散治傷寒體熱煩躁

知母

甘草炙

杏仁炒

竹茹各一分

麻黃

去根節半分

粗羅服一錢水一盞葱白二寸香豉三七粒薑少許煎五分不時溫服量兒增減

抵聖丸治傷寒五日不語熱在胃中

犀角

麻黃去根節

黃芩

釜下黃土

梁上塵

竈突墨

各半兩

川大黃

炒

朴硝

各一兩

末蜜和搗二三百杵丸如彈子服不時新汲水研
一丸如渴飲新汲水當有汗未汗更服汗止熱退
能語兒量服

靈苑紅綿散治寒傷壯熱解表效

黃麻

兩半

乾蝎

七個

天麻

甘草

焙各一分

末一錢紅綿一片摻藥綿上薑一片棗半個煎半

盞冷服

殊聖解交飲

初得傷寒兩日間作時壯熱四稍寒朝來還似
依稀差至夜猶然夜火焚

元明粉一錢加紅粉散二錢分四服茶調下次服

救生丸

無辜門

及真珠散

客忤門

嬰孺當歸湯治傷寒發熱服解肌湯不除宜此

當歸

桂心

甘草

炙

黃芩

芍藥

人參

乾薑

各一兩

大黃

三兩

切水三升煮一升去滓下芒硝一兩再煎三兩沸
三百日兒服半合量加減利為度

治傷寒寒熱不休不能服藥浴湯

莽草

丹參

肉桂

各三兩

菖蒲

半斤

蛇床子

二兩

雷丸

五十個

水三升煮十餘沸適寒溫浴兒

又方

葛根

四兩

麻黃葉

人參

各二兩

甘草

炙

桂心

各兩半

薑

二兩半

水六升棗十枚煮二升百日服一合量增取汗

汗出溫粉粉之

麻黃湯治傷寒寒熱往來

麻黃去節

牡蠣

雷丸各十分

乾薑

桂心

枳殼

厚朴各四分

白欬四分

大黃六分

蜀椒汗一合

豬胎一斤杵熟入絹囊炙微熱摩兒腹背手足汁

盡絞摩訖粉之厚衣抱汗出宜春夏秋冬勿用

漢東王先生治單傷寒及夾驚傷寒紅綿散

麻黃去節

全蝎炒

甘草炙

大黃濕帝

焙

白附子

蘇木炒

天麻生各一錢

末嬰兒一字二三歲半錢水半盞綿臙脂豎子同煎十數沸如無綿裹藥候綿紅色服

治嬰孩變蒸及傷寒溫壯斑瘡水痘夜啼驚叫諸驚餘熱口瘡小便赤七寶輕青丹

螺頭青黛

兩半葛粉

釣藤

炒

天竺黃

各一

分

白附子

字三

丁香

字炒一

麝

半阜子

鈎錫

錢二

末粟米糊九菴豆大嬰孩一九分三服量加薄苛

熟蜜水磨下

張煥羌活湯治傷寒解利邪氣

羌活

防風

川芎

人參各一兩

葛根

川升麻

犀角

甘草各半兩

羅細末服一錢水八分薑二片薄荷三葉煎五分

去滓溫服

治傷寒四五日邪熱不除前胡散

前胡

一兩

甘草

炙

桔梗

半夏

湯洗七次

黃芩

柴胡

人參

各半兩

細末一錢水一盞薑二片棗一枚煎五分去滓溫

服

良方治傷寒風痼小黒膏

烏頭

天南星

路一枚大者燒赤入小瓶濕紙密口火滅刮存中白者

薄苛

玄參

各五錢

蜜和葱白湯調豆許服筋緩急加乳香煎

活人書治一切熱連翹飲

連翹

防風

甘草

山梔仁

等分散二錢水一盞煎七分

治吐血黃疸及腹中熱三黃丸

黃連

三兩

大黃

一兩

黃芩

三兩

細末蜜丸如梧子白湯吞十五丸兒減

治傷寒無汗頭疼發熱惡寒麻黃黃芩湯

麻黃

去節一兩

黃芩

赤芍藥

各半兩

甘草炙

桂枝

去皮各二分

細末二錢煖水調服日三煎治天行熱氣痘瘡不

快益煩躁昏憤或出尚身疼熱

治傷風有汗頭疼發熱惡寒升麻黃芩湯

升麻

黃芩

葛根

芍藥

各三錢

甘草炙錢半

劉如麻豆二錢水一盞煎六分去滓溫服時行瘡
豆出不快煩躁不眠加水香錢半

治身熱頭疼食飲不消腹脹滿或心腹疼痛大小便
不利或下重數起未差可再服兒蒸候哺食減氣息
不快夜啼不眠腹內不調宜下雙丸

巴豆六十粒出油晒如霜

麥門冬二兩半

甘藷一兩一分炙甘遂兩半

朱砂錢一牡蠣煨二兩

雞枌仁四兩半

細末合搗二千杵更入蜜搗極熟旋丸二歲服如
麻子分為一雙量兒加減雞鳴時服日出時不下
熱粥飲進數合即下藥皆準出利甚冷粥飲止
聚寶治驚風及四時傷寒壯熱唇口焦乾兩目翻露
搐搦昏迷紅龍散

龍齒

鉛白霜各二錢

朱砂半錢

龍腦許

天南星

水浸七日日換切晒五錢

細末合後蜜水調半錢服

王氏羌活散治四時傷寒熱病時行疫癘山嵐瘴癘

早晚中露霧及暴中風寒不論陰陽症候老幼虛實
並宜汗出安

川羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

枳殼炒

白茯苓

削木

防風

細辛

官桂

甘草

炙各半兩

細末三錢水一盞薑三片棗二枚煎八分和滓熱

服三服汗出兒加減不及煎熱酒調亦可

丁時發治傷寒咳嗽紅綿散

麻黃

去節 半兩

天麻

全蠍

甘草

炙

人參

白朮

錢各半

末半錢水六分葱白一寸紅綿裹煎四分服

治傷寒一二日頭疼發熱增寒身體疼痛

麻黃

湯浸 焙

石膏

各一兩

蒼朮

山茵陳

桔梗

甘草

炙各半兩

末二錢葱茶調服兒小減

鄭愈治傷寒壯熱宜汗浮萍散

浮萍

麻黃

京芩

天麻

錢各二

末二錢薄苛酒調服瘧出汗

顛風傷寒第九

茅先生兒氣急喫乳不得身溫熱臍塞此因顛未合
母抱睡臍氣衝着顛故臍塞葱涎膏塗顛後磨鎮心
丸氣通愈

貼顛葱涎膏

猪牙皂角 天南星 赤小豆

等分為末葱汁塗顛次塗臍乳

兼治諸驚鎮心

朱砂

白附子

白蠟

酒洗

蟬殼

茯神

各半兩

全蝎

去尾丁一分

腦麝

隨意

末薄荷汁丸如雞頭銀朱拌腦麝衣金銀薄荷湯

磨一九服

夾食傷寒第十

茅先生兒大熱嘔逆肚腫上渴泄瀉因食物傷五藏

結實既得青金丹下三四次

夾驚傷寒門

醒脾散

一胃和

一慢脾風門

勻氣散

胃氣不和門

與服如咳嗽麥湯散

夾驚傷寒門

調理愈

瀟東王先生夾食傷寒與單有積候稍異從膝下熱者為單有積必潮熱取之即補津身熱面青是夾食傷寒先理傷寒后取並審度用藥驗

夾食傷寒者面青吐逆津身熱或渴煩躁頭疼宜水

精丹天明取下觀音散和胃氣不三二服補後下薄苛

散三二服解寒氣餘熱未退七寶輕青丹單傷寒門間人

參散調理

石鐸經歌風髓与坏煎散表夾驚傷寒門烏犀膏取急慢驚門

夾食傷寒先自熱內中有物傷形節即風髓羨自驚身有

熱那更傷
寒來相接

面上紅斑有似丹開口時時生躁渴

先表次取一兩行藏府調和自安悅

此氣血弱食物滯脾胃使肌肉或面如豆大或如
指赤斑點主夜不眠多渴者輕重先取積次和胃
退熱再者證調理

漢東王先生水精丹治夾食傷寒又虫積食積胎積
驚積又惡物食傷

天南星

錢一

滑石

錢二

水銀粉

錢半

蕪荑

仁一百片

巴豆

五十粒

先研巴豆次蕪荑次衆藥爛飯丸粟大服三五丸
歲數加減米湯泡葱空心吞下隔上有食吐出隔
下有食瀉下忌生硬果肉等卧時服

人參散治夾食傷寒取後補虛調胃進食止吐瀉

人參

蓮肉

茯苓

各一

黃蓍

蜜炙半兩

甘草

炙二錢

未嬰孩一字二三歲半錢水半盞棗半個煎十數
沸服

夾驚傷寒第十一

巢氏寒氣客皮膚搏血氣腠理閉密氣不宣泄蘊積
生熱故頭疼體痛而壯熱驚者是熱乘心心主血
脉兒血氣軟弱心神易動為熱所乘故驚不止變驚
癇

漢東王先生渾身壯熱心躁發渴睡裡多驚手足不

定頰赤眼腥瞪直視也小便赤宜薄荷散夾食傷寒門輕青

丹單傷寒門各三二服間調胃藥夾食傷寒門更進七寶牛黃

丸治驚及金連散三二服退熱不退變驚風

玉訣傷寒驚搐歌

傷寒驚搐即生涎胃熱乘虛遍體斑頰赤口乾
脾受熱涎高風微發狂言

此風盛太過先解涎實者下之傷冷溫之熱即利
之利涎調氣無誤

傷寒熱病胃邪攻燥渴頻頻面色紅本是先傳
心與肺急須解利治驚風

此寒在表宜吐煎散次烏犀膏利涎急慢又調榮
衛忌熱藥

石壁經歌

脚冷頭燒氣不和漸生喘急愛眠多有時夢裡
煩頻搐極嗽生涎不柰何吐沫且汗方為妙解
熱消痰去久病汗出除驚方已疾其餘平藥且
調和

先調氣次發汗和解解即涼膈涼膈涎自化涎化
搐自住

形證論如先傷寒退傷寒先驚退驚用南星丸

傷寒變疹

門有餘熱火青膏

未見大青丸急慢驚門

退傷寒與解表散

驚慢

門後調胃散

積熱門

保生論傷寒夾驚脉浮洪兒內停冷乳色嚼之食外
冷風傷于腠戶令面黃頰紅鼻塞氣喘身上寒毛起
鼻流清涕咳嗽噴嚏煩躁吐食頻多下泄小便如粉
皆傷寒候若睡中驚擲狂叫卧不安穩是夾驚傷寒
宜坏煎散三服出汗次鎮心丸一門切只大喘啼叫是
傷寒正候宜三黃散單傷寒門三服次麥湯散
博濟方治驚風傷寒四五日無汗搖頭擡手上竄多
啼叫不睡吃水不仕鈆白霜丸

鉛白霜

朱砂

馬牙硝

人參

天竺黃

甘草

炙各半兩

山梔子

一兩

末蜜丸如梧子服一丸蜜湯化

茅先生迴陽散

蒼朮

一兩米泔浸一宿

甘草

炙

白朮

炮

陳皮

去白各半兩

木香

大附子

炮去皮各一錢

末一錢鹽湯空心點服可夾傷寒藥更看形候

麥湯散

知母

人參

茯苓

杏仁

去白

肉桂

石膏

滑石

甜葶藶

甘草炙

地骨皮分等

麻黃去節加

末一錢者大小麥煎湯調服依形候調理

張渙金泥膏治傷寒邪熱藥心兼發驚

菖蒲一十節

遠志

釣藤各一兩

人參

草龍膽

甘草炙各半兩

搗羅次用

水銀分一

金箔味甘片二牛黃

麝射各一錢

用銀石鍋水二升八諸藥慢火熬至一升新綿濾滓下酥四兩蜜半斤金泥柳枝不住攪熬膏磁合

盛每一大豆薄苛湯化下

祛風鎮驚及傷寒夾驚防風天麻膏

防風

天麻

人參各一分

甘草炙

白蠶蚕

乾金蝎

白附子各半兩

細末次用

朱砂

飛一錢

牛黃

分一

麝香

錢一

拌勻蜜丸阜子大服一粒薄苛湯化

玉訣治夾驚傷寒解驚發汗坯煎散

全蝎

川烏

炮去皮尖

甘草炙

朱砂

大黃炮

羌活

川芎

麻黃去節

天麻酒浸

白蠟去絲分兩關

腦麝各少許

末一錢入坯子五粒葱白半寸煎三四沸通口服
二三服出汗

石壁經白附子散

白附子

朱砂各三分

全蝎半

黑附子炮

雄黃

羌活各半兩

石膏七錢半

麻黃去節一兩

腦麝隨意

末半錢或一字薄苛臘茶湯調服如熱再服

鳳髓經坯煎散治夾驚傷寒壯熱睡中驚擲嘔嗽煩躁泄多

川烏頭

炮半兩

大黃

蒸三錢

雄黃

白附子

甘草

炙

川芎

天麻

蠶蚕

各一錢

麻黃

去節四錢

麝

少許

末半錢加至一錢半水半盞入坯子三粒葱白半

寸煎數沸溫服如出汗併三服

保主治變蒸伏熱傷寒欬嗽嘔噎體熱面赤麥湯散

麻黃

去節

滑石

甘草

杏仁

大黃

牡荖麋

地骨皮

等分細末一錢減至一字小麥薄苛湯下

劉氏治夾驚傷寒吐逆躁悶熱渴夜啼不睡常服溫平鎮心不涼過百日常服不妨紅綿散

全蝎

人參

白茯苓

天麻

各一分

麻黃

去節半兩

大辰

砂錢一

細末一錢水少許薄苛葉同煎十沸溫服

吉氏治驚胃虛吐後搐搦眼唇俱青不進飲食是夾驚傷寒沒石子膏

沒石子

生三箇

人參

訶子

炮

白朮

各二錢

丁香

五七箇

甘草

炙半兩

香附子

去皮七箇

世

末煮猪肉熬研丸如梧子不進飲食白朮湯下

治夾驚傷寒鐵刷散

麻黃

去節根一兩

甘草

炙半兩

細辛

半兩

石膏

華蘆

青皮

各一分

杏仁

十一箇

末外風把定關竅三二日面黃白壯熱發渴此傷

寒候三五日內心藏熱面赤唇紅多躁壯熱熱極

生涎即夾驚傷寒下異攻散二服紫蘇木瓜同此

半錢水一盞薑三片煎四分溫服頭面微汗寒不
退如壯熱煎勝金散如壯熱後多睡更煩躁口乾
手足冷是外風把定關竅用綿煎散汗出竅通用
異攻散胃氣不和和氣更服此解傷寒

治傷寒退熱綿煎散

麻黃

去節一兩

天麻

紫蘇

南星

油煎

蠶

各半

末兒傷寒驚風壯熱面熱沉困頭疼不進飲食物
一盞藥半錢綿一片薄苛湯調服睡時更煎鐵刷

散無驚二日進二服效

朱氏天竺黃散

白蟻蚕

鬱金

蟬退

甘草炙

天竺黃

山梔子

等分末半錢金銀薄苛湯服

丁時發乳香膏治夾驚傷寒壯熱涎鳴風熱壅盛鎮
心化涎退熱定搐

朱砂

鈎白霜

天竺黃

葛粉

人參

茯苓

各半兩

天麻

甘草

炙各三錢

白附子

分一

乳香錢二

牛黃

腦麝

各半

細末蜜丸梧子大薄荷湯化下二九

鄭愈無惜散

紫背浮萍

錢一

犀角錢半

釣藤鈎

個三七

末半錢蜜水調服連進三服汗為度常服佳